

DISINTYL

soluzione tanica 25 lt AIC 033106067

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**DISINTYL
Benzalconio cloruro****Composizione:**

100 g di soluzione contengono:

Principio attivo:

Benzalconio cloruro 200 mg

Eccipienti:

Essenza di limone, Colore E 104, Acqua deionizzata.

Come si presenta:

DISINTYL si presenta in forma di soluzione disinfettante per uso esterno.

Il contenuto delle confezioni è di 50 ml, 200 ml, 240 ml, 1000 ml e 25 lt.

DISINTYL si presenta anche in forma di soluzione da nebulizzare.

Il contenuto della confezione è di 100 ml.

Che cosa è:

È un antisettico e disinfettante (derivato ammonico quaternario - ATC: D08AJ01).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Mentana n° 38 - 36100 Vicenza

Produttore e controllore finale:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Galvani n°10 - 36066 Sandrigo (VI).

Perché si usa:

DISINTYL si usa per la disinfezione e pulizia (o toletta) della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni) e dei genitali esterni.

Quando non deve essere usato:

In caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (come i normali saponi).

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico

DISINTYLsoluzione tanica 25 lt AIC 033106067

- In gravidanza ed allattamento (vedere “Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento”).

Cosa fare durante la gravidanza e l’allattamento:

In caso di gravidanza DISINTYL deve essere impiegato per l’igiene intima esterna solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l’effetto del medicinale

DISINTYL è incompatibile con detergenti anionici, saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, tartrati, salicilati e sali d’argento.

Evitare l’uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (vedere “Quando medicinale non deve essere usato”)

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

DISINTYL è solo per uso esterno per la disinfezione di cute, mucose e ferite.

Si deve evitare il contatto con gli occhi e l’applicazione nell’orecchio.

Bisogna evitare l’esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l’applicazione del prodotto.

L’uso, specie se prolungato, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione: in tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea.

DISINTYL non ha alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Note di educazione sanitaria:

Nel caso di piccole ferite 1) lavarsi bene le mani con acqua e sapone; 2) lasciare sanguinare la ferita per alcuni secondi; 3) lavare bene la ferita con acqua corrente e sapone per rimuovere eventuale polvere o terriccio procedendo dall’interno all’esterno. 4) Disinfettare la ferita.

È importante utilizzare solo disinfettanti specifici per la cute lesa, preferibilmente non alcoolici poiché l’alcool ritarda la guarigione e provoca dolore.

DISINTYL

soluzione tanica 25 lt AIC 033106067

Come usare questo medicinale**Quanto**

Disinfezione delle ferite e della cute lesa:

impiegare una quantità di soluzione o di nebulizzazioni in rapporto alla superficie cutanea da trattare.

Disinfezione dei genitali esterni

1 cucchiaino di soluzione in 1 litro di acqua o 7-10 nebulizzazioni direttamente sulla parte interessata.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.**Quando e per**

2 - 3 volte al giorno

Quanto tempo**Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.****Come**

Disinfezione delle ferite e della cute lesa:

applicare la soluzione senza diluirla con un batuffolo di cotone o nebulizzare sulla parte interessata. In caso di lesioni profonde irrorare abbondantemente.

Disinfezione dei genitali esterni

effettuare un lavaggio prolungato con la soluzione diluita oppure, dopo aver nebulizzato la soluzione direttamente sulla parte interessata, risciacquare abbondantemente con acqua.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale:

Non sono noti inconvenienti dovuti ad un sovradosaggio.

L'ingestione accidentale di DISINTYL può provocare nausea e vomito.

L'ingestione di quantità rilevanti (oltre 500 ml) può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione di quantità rilevanti di DISINTYL evitare emesi (vomito) e lavanda gastrica.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di DISINTYL avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**Effetti indesiderati**

È possibile in qualche caso l'insorgere di bruciore o irritazione privi peraltro di conseguenze, che non richiedono modifica del trattamento.

DISINTYLsoluzione tanica 25 lt AIC 033106067

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Conservare il recipiente ben chiuso al riparo dalla luce.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AIC 033106067

Lotto n°:.....

Scad.: (mese/anno)

Regime di fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

Bollino di riconoscimento per i medicinali esenti da ricetta medica (farmaco senza obbligo di ricetta)

Prezzo massimo di vendita €:

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità:

DISINTYL

soluzione flacone 50 ml AIC 033106016

soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml AIC 033106028

soluzione flacone 200 ml AIC 033106030

soluzione flacone 240 ml AIC 033106042

soluzione flacone 1000 ml AIC 033106055

PRIMA DELL'USO LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

**DISINTYL
Benzalconio cloruro****Composizione:**

100 g di soluzione contengono:

Principio attivo:

Benzalconio cloruro 200 mg

Eccipienti:

Essenza di limone, Colore E 104, Acqua deionizzata.

Come si presenta:

DISINTYL si presenta in forma di soluzione disinfettante per uso esterno.

Il contenuto delle confezioni è di 50 ml, 200 ml, 240 ml, 1000 ml e 25 lt.

DISINTYL si presenta anche in forma di soluzione da nebulizzare.

Il contenuto della confezione è di 100 ml.

Che cosa è:

È un antisettico e disinfettante (derivato ammonico quaternario - ATC: D08AJ01).

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Mentana n° 38 - 36100 Vicenza

Produttore e controllore finale:

ZETA FARMACEUTICI S.p.A. - Via Galvani n°10 - 36066 Sandrigo (VI).

Perché si usa:

DISINTYL si usa per la disinfezione e pulizia (o toletta) della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni) e dei genitali esterni.

Quando non deve essere usato:

In caso di ipersensibilità verso i componenti o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

DISINTYL

soluzione flacone 50 ml AIC 033106016

soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml AIC 033106028

soluzione flacone 200 ml AIC 033106030

soluzione flacone 240 ml AIC 033106042

soluzione flacone 1000 ml AIC 033106055

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (come i normali saponi).

Quando può essere usato solo dopo avere consultato il medico

- In gravidanza ed allattamento (vedere “Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento”).

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento:

In caso di gravidanza DISINTYL deve essere impiegato per l'igiene intima esterna solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

DISINTYL è incompatibile con detergenti anionici, saponi, citrati, ioduri, nitrati, permanganati, tartrati, salicilati e sali d'argento.

Evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti (vedere “Quando medicinale non deve essere usato”)

Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

È importante sapere che

DISINTYL è solo per uso esterno per la disinfezione di cute, mucose e ferite.

Si deve evitare il contatto con gli occhi e l'applicazione nell'orecchio.

Bisogna evitare l'esposizione ai raggi ultravioletti (sole o sorgenti artificiali) dopo l'applicazione del prodotto.

L'uso, specie se prolungato, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione: in tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea.

DISINTYL non ha alcun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari.

Note di educazione sanitaria:

Nel caso di piccole ferite 1) lavarsi bene le mani con acqua e sapone; 2) lasciare sanguinare la ferita per alcuni secondi; 3) lavare bene la ferita con acqua corrente e sapone per rimuovere eventuale polvere o terriccio procedendo dall'interno all'esterno.

4) Disinfettare la ferita.

È importante utilizzare solo disinfettanti specifici per la cute lesa, preferibilmente non alcoolici poiché l'alcool ritarda la guarigione e provoca dolore.

DISINTYL

soluzione flacone 50 ml AIC 033106016

soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml AIC 033106028

soluzione flacone 200 ml AIC 033106030

soluzione flacone 240 ml AIC 033106042

soluzione flacone 1000 ml AIC 033106055

Come usare questo medicinale

<u>Quanto</u>	Disinfezione delle ferite e della cute lesa:	impiegare una quantità di soluzione o di nebulizzazioni in rapporto alla superficie cutanea da trattare.
	Disinfezione dei genitali esterni	1 cucchiaino di soluzione in 1 litro di acqua o 7-10 nebulizzazioni direttamente sulla parte interessata.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

<u>Quando e per</u>	2 - 3 volte al giorno
<u>Quanto tempo</u>	

Attenzione: usare solo per brevi periodi di trattamento.

<u>Come</u>	Disinfezione delle ferite e della cute lesa:	applicare la soluzione senza diluirla con un batuffolo di cotone o nebulizzare sulla parte interessata. In caso di lesioni profonde irrorare abbondantemente.
	Disinfezione dei genitali esterni	effettuare un lavaggio prolungato con la soluzione diluita oppure, dopo aver nebulizzato la soluzione direttamente sulla parte interessata, risciacquare abbondantemente con acqua.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale:

Non sono noti inconvenienti dovuti ad un sovradosaggio.

L'ingestione accidentale di DISINTYL può provocare nausea e vomito.

L'ingestione di quantità rilevanti (oltre 500 ml) può avere conseguenze gravi, talvolta fatali.

In caso di ingestione di quantità rilevanti di DISINTYL evitare emesi (vomito) e lavanda gastrica.

In caso di ingestione accidentale di una dose eccessiva di DISINTYL avvertire immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

DISINTYL

soluzione flacone 50 ml AIC 033106016

soluzione flacone con nebulizzatore 100 ml AIC 033106028

soluzione flacone 200 ml AIC 033106030

soluzione flacone 240 ml AIC 033106042

soluzione flacone 1000 ml AIC 033106055

Effetti indesiderati

È possibile in qualche caso l'insorgere di bruciore o irritazione privi peraltro di conseguenze, che non richiedono modifica del trattamento.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Non usare il prodotto se la confezione presenta segni visibili di deterioramento.

Conservare il recipiente ben chiuso al riparo dalla luce.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Sanità: Febbraio 2002